



bservatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®



# Encuesta de Anticoncepción en España y datos de Andalucía



**INFORME DE RESULTADOS**



Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos	3
Consulta médica e información	9
Métodos anticonceptivos utilizados	15
No uso de anticonceptivos	24
Uso de anticonceptivos reversibles	34
Uso de método hormonal combinado	42
Uso de preservativos	48
Uso de DIU	60
Uso de métodos irreversibles	63
Metodología	67



Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®




## **Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos**



## Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos

### Han tenido relaciones sexuales

Base: total mujeres de 15 a 49 años



■ Ha tenido relaciones sexuales ■ Nunca ha tenido relaciones sexuales ■ Ns/Nc

### Uso de método anticonceptivo en la primera relación

Base: mujeres de 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales




■ Sí ■ No ■ NS/NC

- ❖ El 89,9% de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales.
- ❖ El 24,8% de estas mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.



## Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos

### Uso de método anticonceptivo en la primera relación



❖ El uso de algún método anticonceptivo en la primera relación sexual, se ha ido haciendo cada vez más frecuente.

❖ Mientras que entre las mujeres de 45 a 49 años, el uso de método anticonceptivo en su primera relación se sitúa en el 57,7% de los casos, esta práctica se ha ido incrementando en las sucesivas generaciones.

❖ Pero hay que llamar la atención sobre el descenso que se registra entre las mujeres de 20 a 24 años (84,9%) y el grupo de las más jóvenes (76,6%).

❖ El uso de método anticonceptivo en la primera relación, es menos habitual entre las mujeres con estudios primarios y nivel de ingresos bajo.


	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS			INGRESOS FAMILIARES			
		Primarios	Secundarios	Universitarios	Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Sí	73,6%	53,2%	70,4%	82,5%	75,1%	79,4%	71,1%	57,8%
No	24,8%	42,2%	28,0%	16,6%	24,6%	19,4%	27,4%	40,1%
NS/NC	1,6%	4,6%	1,6%	1,0%	0,3%	1,2%	1,5%	2,0%

Base: mujeres de 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales



## Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos

### Primer método anticonceptivo utilizado




- ❖ El preservativo es primer el método anticonceptivo utilizado por las mujeres españolas (92,9%).
- ❖ Esta circunstancia está generalizada, de manera que el preservativo es el primer método anticonceptivo utilizado por la gran mayoría de las mujeres a lo largo de las distintas generaciones.
- ❖ Uso que incluso se ha ampliado, al pasar de producirse en el 84% de las mujeres de 45 a 49 años, al 96,1% en el caso de las españolas más jóvenes.
- ❖ Cabe destacar que entre las mujeres con menos nivel de estudios, y en las de mayor edad se eleva el uso de la píldora como método utilizado por primera vez

	TOTAL	EDAD						NIVEL DE ESTUDIOS			
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años	Primarios	Secundarios	Universitarios
<b>Preservativo</b>	<b>92,9%</b>	96,1%	96,9%	91,9%	97,0%	96,2%	90,3%	84,0%	70,5%	92,8%	94,8%
<b>Píldora</b>	<b>5,9%</b>	1,8%	2,1%	7,4%	2,9%	3,8%	7,2%	13,4%	24,4%	6,0%	4,4%
<b>DIU (Dispositivo Intra</b>	<b>0,1%</b>						0,6%			0,2%	
<b>Anillo vaginal</b>	<b>0,2%</b>		0,5%	0,7%							0,5%
<b>Inyectable (inyecciones</b>	<b>0,0%</b>				0,2%					0,1%	
<b>Coitus interruptus (marcha</b>	<b>0,2%</b>	2,1%					0,4%	0,2%	3,1%	0,2%	
<b>Espermicidas (cremas u</b>	<b>0,1%</b>							0,4%			0,2%
<b>Otro</b>	<b>0,3%</b>		0,5%					1,5%	2,0%	0,4%	
<b>Ninguno</b>	<b>0,3%</b>						1,2%	0,4%		0,4%	
<b>NS/NC</b>	<b>0,1%</b>						0,3%	0,2%			0,2%



## Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos

### Edad de Planificación



- ❖ La edad media a partir de la cual las mujeres españolas comienzan a utilizar de forma planificada algún método anticonceptivo es de 20,71 años.
- ❖ Esta edad ha ido descendiendo, de manera que las mujeres que ahora tienen entre 45 y 49 años, comenzaron a utilizar preservativos de manera planificada a los 22,66 años
- ❖ Aunque sin diferencias significativas, cabe señalar un leve retraso en la edad de inicio de esta planificación entre las mujeres con mayor nivel de estudios e ingresos

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS			INGRESOS FAMILIARES			
		Primarios	Secundarios	Universitarios	Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Media	20,71	20,71	20,45	21,23	21,70	21,06	20,40	20,93

Base: mujeres de 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales



## Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos

### Uso de método anticonceptivo en la primera relación

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	ANDALUCIA
Sí	73,6%	69,9%
No	24,8%	28,3%
NS/NC	1,6%	1,8%

- ❖ El uso de algún método anticonceptivo en la primera relación sexual, se sitúa por debajo de la media nacional

### Primer método anticonceptivo utilizado

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	ANDALUCIA
Preservativo	92,9%	92,6%
Pildora	5,9%	5,8%
DIU (Dispositivo Intra	0,1%	0,4%
Anillo vaginal	0,2%	
Inyectable (inyecciones	0,0%	
Coitus interruptus	0,2%	0,4%
Espermicidas (cremas u óvulos vaginales)	0,1%	
Otro	0,3%	
Ninguno	0,3%	0,8%
NS/NC	0,1%	

- ❖ En Andalucía, el preservativo es primer el método anticonceptivo utilizado por las mujeres, siempre por encima del 92'9%.

### Edad de Planificación

COMUNIDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	ANDALUCIA
Media	20,71	20,85

- ❖ La edad media de inicio planificado de anticonceptivos se sitúan en torno a los 20 años.



Observatorio DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SEC®




## Consulta médica e información



## Consulta médica e información


### Conocimiento de métodos contraindicados

Base: total mujeres de 15 a 49 años



### Consulta médica para indicación de método

Base: total mujeres de 15 a 49 años




- ❖ La gran mayoría de las mujeres (90,7%) se manifiestan conocedoras de que hay anticonceptivos que pueden tener contraindicaciones o efectos secundarios.
- ❖ Sin embargo, el 39,8% de las mujeres españolas de 15 a 49 años no ha acudido a un médico de atención primaria, ginecólogo, matrona o centro de planificación para que la indicarán el método anticonceptivo más idóneo para ella.



## Consulta médica e información

### Conocimiento de métodos contraindicados




TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS			INGRESOS FAMILIARES				
	Primarios	Secundarios	Universitarios	Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos	
<b>Sí</b>	<b>90,7%</b>	<b>75,9%</b>	88,6%	97,2%	96,3%	94,3%	88,4%	<b>86,9%</b>
<b>No</b>	<b>9,0%</b>	23,4%	11,1%	2,8%	3,3%	5,6%	11,6%	12,3%
<b>NS/NC</b>	<b>0,2%</b>	0,7%	0,3%	0,1%	0,4%	0,1%		0,8%

Base: total mujeres de 15 a 49 años

- ❖ El conocimiento de que hay métodos anticonceptivos contraindicados o con efectos secundarios para algunas mujeres, desciende al 71,5% entre las menores de 20 años. También lo hace, aunque en menor medida entre las mujeres con menor nivel de estudios e ingresos.

### Consulta médica para indicación de método



TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS			INGRESOS FAMILIARES			
	Primarios	Secundarios	Universitarios	Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
<b>Sí</b>	<b>60,1%</b>	<b>53,5%</b>	64,3%	67,9%	62,4%	62,4%	63,5%
<b>No</b>	<b>39,8%</b>	46,5%	35,7%	32,1%	37,3%	37,6%	36,5%
<b>NS/NC</b>	<b>0,1%</b>		0,1%		0,3%		

Base: total mujeres de 15 a 49 años

- ❖ La asistencia de las mujeres a alguna consulta médica para que les indiquen el método anticonceptivo más idóneo a cada caso, aumenta con la edad; siendo muy poco frecuente (19,8%) en los primeros años del periodo de edad fértil.



## Consulta médica e información

### Conocimiento de métodos contraindicados

	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
Sí	90,7%	88,5%
No	9,0%	11,2%
NS/NC	0,2%	0,2%

Base: total mujeres de 15 a 49 años

- ❖ El conocimiento de que hay métodos anticonceptivos contraindicados o con efectos secundarios para algunas mujeres, se sitúa por debajo de la media nacional.

### Consulta médica para indicación de método

	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
Sí	60,1%	54,1%
No	39,8%	45,9%
NS/NC	0,1%	


Base: total mujeres de 15 a 49 años

- ❖ La asistencia de las mujeres a alguna consulta médica para que les indiquen el método anticonceptivo más idóneo a cada caso, desciende, por debajo del 60% en Andalucía




## Consulta médica e información

### Conocimiento del doble método



- ❖ El 82% de las mujeres de 15 a 49 años conoce o ha oído hablar del Doble Método, consistente en la utilización conjunta de un método eficaz para prevenir el embarazo (como por ejemplo la píldora, el DIU, el anillo vaginal, el parche, un implante o una inyección) con el preservativo, que previene de las ETS.
- ❖ Este nivel de conocimiento desciende al 71,4% entre las mujeres más jóvenes.
- ❖ Igualmente, el conocimiento de este uso combinado de métodos para prevenir el embarazo y las ETS, desciende entre las mujeres con menor nivel de estudios y las de menores ingresos familiares.




	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS		
		Primarios	Secundarios	Universitarios
Sí	82,4%	66,2%	82,3%	85,2%
No	17,2%	31,7%	17,5%	14,4%
NS/NC	0,4%	2,1%	0,3%	0,4%

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Sí	82,4%	85,8%	84,1%	81,5%	78,4%
No	17,2%	14,2%	15,5%	18,3%	21,1%
NS/NC	0,4%		0,3%	0,3%	0,4%



## Consulta médica e información

### Conocimiento de la Píldora del Día Después



❖ En línea con los estudios específicos realizados sobre la píldora del día después, hay un conocimiento generalizado de este método anticonceptivo de emergencia.

	TOTAL	EDAD							NIVEL DE ESTUDIOS			INGRESOS FAMILIARES			
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años	Primarios	Secundarios	Universitarios	Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
<b>Sí</b>	<b>99,2%</b>	99,5%	98,9%	98,8%	100,0%	100,0%	98,5%	98,8%	96,3%	99,2%	99,8%	99,1%	99,7%	99,7%	97,7%
<b>No</b>	<b>0,6%</b>	0,5%	1,1%	1,2%			0,7%	0,9%	3,0%	0,7%	0,2%	0,9%	0,3%		2,1%
<b>NS/NC</b>	<b>0,2%</b>						0,7%	0,4%	0,7%	0,2%				0,3%	0,3%




## Métodos anticonceptivos utilizados



## Métodos anticonceptivos utilizados

### Utilizan algún método




\*La opción "ninguno" incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones

❖ El 72,7% de las mujeres españolas en edad fértil utiliza algún método anticonceptivo. Por el contrario, el 27,3% no utiliza ninguno, si bien debe tenerse en cuenta que en este porcentaje se incluyen todas aquellas mujeres que no mantienen relaciones sexuales

❖ Teniendo en cuenta esto, el 11,4% no utiliza ningún método pero no mantiene relaciones sexuales; mientras que el 15,9% está manteniendo relaciones sexuales sin utilizar ningún método anticonceptivo.

❖ El porcentaje de mujeres que no utiliza ningún método anticonceptivo se incrementa entre las mujeres más jóvenes (15 a 19 años), pero debe tenerse en cuenta que en este segmento es mayoritaria la proporción de mujeres que no mantiene relaciones sexuales.




	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS			INGRESOS FAMILIARES			
		Primarios	Secundarios	Universitarios	Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Utilizan algún método anticonceptivo	72,7%	51,6%	72,2%	77,2%	72,4%	76,7%	77,9%	66,8%
No utilizan ninguno	27,3%	48,4%	27,7%	22,8%	27,6%	23,3%	21,9%	33,2%
NS/NC	0,0%		0,1%				0,2%	



## Métodos anticonceptivos utilizados

### Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal (única respuesta)

Base: total mujeres de 15 a 49 años



\*La opción "ninguno" incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales

❖ El preservativo (31,3%) es el método anticonceptivo principal utilizado actualmente por mayor número de mujeres en edad fértil, lo que representa el 42% entre aquellas que utilizan alguno quienes seguido de la píldora (16,2%).

❖ Debe tenerse en cuenta que este dato corresponde al método principal, pero que hay mujeres que utilizan varios métodos de manera simultánea o que utilizan otros métodos con alguna frecuencia (en torno al 10% según otros estudios realizados por la SEC y Sigma Dos).



## Métodos anticonceptivos utilizados

### Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal (única respuesta)

Base: total mujeres de 15 a 49 años

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24	de 25 a 29	de 30 a 34	de 35 a 39	de 40 a 44	de 45 a 49 años
<b>Preservativo</b>	<b>31,3%</b>	37,6%	47,1%	33,4%	33,3%	27,0%	28,8%	20,0%
<b>Píldora</b>	<b>16,2%</b>	8,8%	26,5%	28,4%	20,9%	17,2%	8,4%	6,4%
<b>Mini Píldora o píldora solo gestagenos</b>	<b>0,3%</b>			0,6%	0,5%	0,7%		
<b>DIU (Dispositivo Intra Uterino) de cobre</b>	<b>3,6%</b>		2,4%	1,6%	2,7%	5,3%	6,6%	5,2%
<b>DIU (Dispositivo Intra Uterino) Mirena Hormonal</b>	<b>2,5%</b>			0,5%	2,0%	5,3%	4,0%	4,1%
<b>Anillo vaginal</b>	<b>3,2%</b>	1,2%	6,4%	8,4%	4,8%	1,2%	1,0%	0,1%
<b>Parche (pegado en la piel)</b>	<b>1,3%</b>	0,4%	0,8%	4,2%	1,6%	0,8%	0,7%	0,2%
<b>Inyectable (inyecciones trimestrales)</b>	<b>0,1%</b>	0,5%	0,8%					
<b>Implante subcutáneo</b>	<b>0,5%</b>			0,5%	1,9%	0,4%	0,2%	
<b>Diafragma</b>	<b>0,0%</b>	0,4%						
<b>Coitus interruptus (marcha atrás)</b>	<b>0,8%</b>			1,4%	1,3%	0,6%	1,3%	0,5%
<b>Métodos naturales de control y abstinencia periódica (Ogino, etc...)</b>	<b>0,1%</b>					0,4%		0,1%
<b>Espemicidas (cremas u óvulos vaginales)</b>	<b>0,0%</b>				0,2%			
<b>Otro</b>	<b>0,1%</b>			0,4%				0,2%
<b>Ligadura de trompas/método Essure (Obstrucción tubarica)</b>	<b>5,5%</b>			0,4%	2,2%	6,2%	11,1%	13,9%
<b>No utiliza ninguno pero su pareja tiene la vasectomía</b>	<b>7,2%</b>			0,5%	2,1%	9,3%	17,4%	15,9%
<b>Ninguno</b>	<b>27,3%</b>	51,1%	16,0%	19,6%	26,4%	25,5%	20,5%	33,3%
<b>NS/NC</b>	<b>0,0%</b>							0,2%

\*La opción "ninguno" incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales, que en el caso de las mujeres de 15 a 19 años son el 46,7%

- ❖ El preservativo es el método anticonceptivo principal más frecuente en todos los intervalos de edad, si bien su utilización tiende a descender con la edad y los correspondientes cambios en la etapa de vida.
- ❖ El uso de la píldora alcanza sus valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, descendiendo también posteriormente con la edad.
- ❖ La utilización de Dispositivos Intrauterinos se produce básicamente a partir de los 30 años, mientras que los métodos irreversibles se registran fundamentalmente –y de manera creciente- a partir de los 35 años.



## Métodos anticonceptivos utilizados

### Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal (única respuesta)

Base: total mujeres de 15 a 49 años

MÉTODOS EFICACES	DE BARRERA	PRESERVATIVO		31,3%		71,70%
	HORMONALES	POR VIA ORAL	PILDORA	16,2%	16,5%	
MINI PILDORA			0,3%			
POR VIA INTRAVAGINAL		ANILLO VAGINAL	3,2%	4,5%		
		PARCHE	1,3%			
INYECTABLE (MENSUAL - TRIMESTRAL)		0,1%				
IMPLANTE SUBCUTANEO (1 ó 2 BARRAS)		0,5%				
DIU	DE COBRE		3,6%		6,1%	
	DE LIBERACIÓN HORMONAL		2,5%			
ESTERILIZACIÓN VOLUNTARIA (IRREVERSIBLES)	LIGADURA DE TROMPAS				12,7%	
	METODO ESSURE (OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA)		5,5%			
	VASECTOMIA		7,2%			
MÉTODOS POCO EFICACES	NATURALES O DE ABSTINENCIA PERIÓDICA	OGINO (RITMO DEL CALENDARIO), BILLINGS (MOCO CERVICAL), MÉTODO SINTOTÉRMICO		0,1%		0,90%
	DE INTERRUPCIÓN	COITO INTERUMPIDO (MARCHA ATRÁS)		0,8%		
OTROS			0,1%			
NO USAN NINGUNO MÉTODO			27,2%			

- ❖ Considerando los distintos métodos anticonceptivos principales y sus características, cabe señalar que el 71,7% de las mujeres en edad fértil utiliza **métodos eficaces**.
- ❖ Atendiendo a un mayor nivel de desglose, el 31,3% utiliza **métodos de barrera**, el 21,6% **métodos hormonales** y el 12,7% de las mujeres utiliza **métodos irreversibles** de esterilización voluntaria, bien suya o de se pareja.


\*La opción "ninguno" incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales, que en el caso de las mujeres de 15 a 19 años son el 46,7%



## Métodos anticonceptivos utilizados

### Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal + Doble Método

Base: total mujeres de 15 a 49 años



\*La opción "ninguno" incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales

- ❖ En esta gráfica se presenta de manera agregada el método señalado como principal con el datos declarado de uso de doble método.
- ❖ En concreto, se tienen en cuenta las que utilizan como método principal algún método hormonal pero con alguna frecuencia utilizan el preservativo, y las que utilizan el preservativo como método principal pero también la píldora con alguna frecuencia.
- ❖ De esta manera, el uso del preservativo alcanza el 34,6% y el de la píldora se eleva al 17,5%.



## Métodos anticonceptivos utilizados

### Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal + Doble Método

Base: total mujeres de 15 a 49 años

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24	de 25 a 29	de 30 a 34	de 35 a 39	de 40 a 44	de 45 a 49 años
Preservativo	34,6%	42,2%	54,3%	39,8%	36,4%	30,1%	29,7%	20,3%
Píldora	17,5%	10,4%	30,0%	30,4%	22,3%	18,0%	8,6%	6,9%
Mini Píldora o píldora solo gestagenos	0,3%			0,6%	0,5%	0,7%		
DIU (Dispositivo Intra Uterino) de cobre	3,6%		2,4%	1,6%	2,7%	5,3%	6,6%	5,2%
DIU (Dispositivo Intra Uterino) Mirena Hormonal	2,5%			0,5%	2,0%	5,3%	4,0%	4,1%
Anillo vaginal	3,2%	1,2%	6,4%	8,4%	4,8%	1,2%	1,0%	0,1%
Parche (pegado en la piel)	1,3%	0,4%	0,8%	4,2%	1,6%	0,8%	0,7%	0,2%
Inyectable (inyecciones trimestrales)	0,1%	0,5%	0,8%					
Implante subcutáneo	0,5%			0,5%	1,9%	0,4%	0,2%	
Diafragma	0,0%	0,4%						
Coitus interruptus (marcha atrás)	0,8%			1,4%	1,3%	0,6%	1,3%	0,5%
Métodos naturales de control y abstinencia periódica (Ogino, etc...)	0,1%					0,4%		0,1%
Espermicidas (cremas u óvulos vaginales)	0,0%				0,2%			
Otro	0,1%			0,4%				0,2%
Ligadura de trompas/método Essure (Obstrucción tubarica)	5,5%			0,4%	2,2%	6,2%	11,1%	13,9%
No utiliza ninguno pero su pareja tiene la vasectomía	7,2%			0,5%	2,1%	9,3%	17,4%	15,9%
Ninguno	27,3%	51,1%	16,0%	19,6%	26,4%	25,5%	20,5%	33,3%
NS/NC	0,0%							0,2%

\*La opción "ninguno" incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales



## Métodos anticonceptivos utilizados

### Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal (única respuesta)

	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
Base: total mujeres de 15 a 49 años		
Preservativo	31,3%	33,7%
Píldora	16,2%	15,1%
Mini Píldora o píldora solo gestagenos	0,3%	0,6%
DIU (Dispositivo Intra Uterino) de cobre	3,6%	1,5%
DIU (Dispositivo Intra Uterino) Mirena Hormonal	2,5%	2,2%
Anillo vaginal	3,2%	2,7%
Parche (pegado en la piel)	1,3%	0,2%
Inyectable (inyecciones trimestrales)	0,1%	
Implante subcutáneo	0,5%	
Diafragma	0,0%	
Coitus interruptus (marcha atrás)	0,8%	1,5%
Métodos naturales de control y abstinencia periódica (Ogino, etc...)	0,1%	
Espemicidas (cremas u óvulos vaginales)	0,0%	
Otro	0,1%	0,4%
Ligadura de trompas/método Essure (Obstrucción tubarica)	5,5%	8,0%
No utiliza ninguno pero su pareja tiene la vasectomía	7,2%	7,7%
Ninguno	27,3%	26,4%
NS/NC	0,0%	

\*La opción "ninguno" incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales

- ❖ El uso del preservativo como método anticonceptivo principal se destaca respecto del conjunto



## Métodos anticonceptivos utilizados

### Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal + Doble Método

	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
Base: total mujeres de 15 a 49 años		
<b>Preservativo</b>	<b>34,6%</b>	35,8%
<b>Píldora</b>	<b>17,5%</b>	17,8%
<b>Mini Píldora o píldora solo gestágenos</b>	<b>0,3%</b>	0,6%
<b>DIU (Dispositivo Intra Uterino) de cobre</b>	<b>3,6%</b>	1,5%
<b>DIU (Dispositivo Intra Uterino) Mirena Hormonal</b>	<b>2,5%</b>	2,2%
<b>Anillo vaginal</b>	<b>3,2%</b>	2,7%
<b>Parche (pegado en la piel)</b>	<b>1,3%</b>	0,2%
<b>Inyectable (inyecciones trimestrales)</b>	<b>0,1%</b>	
<b>Implante subcutáneo</b>	<b>0,5%</b>	
<b>Diafragma</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Coitus interruptus (marcha atrás)</b>	<b>0,8%</b>	1,5%
<b>Métodos naturales de control y abstinencia periódica (Ogino, etc...)</b>	<b>0,1%</b>	
<b>Espermicidas (cremas u óvulos vaginales)</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Otro</b>	<b>0,1%</b>	0,4%
<b>Ligadura de trompas/método Essure (Obstrucción tubárica)</b>	<b>5,5%</b>	8,0%
<b>No utiliza ninguno pero su pareja tiene la vasectomía</b>	<b>7,2%</b>	7,7%
<b>Ninguno</b>	<b>27,3%</b>	26,4%
<b>NS/NC</b>	<b>0,0%</b>	

\*La opción "ninguno" incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales



## No uso de anticonceptivos



## No uso de métodos anticonceptivos

### Utilizan / No utilizan algún método


Base: total mujeres de 15 a 49 años



### No utilizan métodos anticonceptivos

EDAD

Base: mujeres de 15 a 49 años que no utilizan métodos anticonceptivos




- ❖ Como ya se ha señalado anteriormente, el 27,3% de las mujeres en edad fértil no utiliza ningún método anticonceptivo.
- ❖ Teniendo en cuenta su actividad sexual, esta cifra se desglosa en un 11,4% que no utiliza ningún método pero no mantiene relaciones sexuales; y un 15,9% que está manteniendo relaciones sexuales sin utilizar ningún método anticonceptivo.
- ❖ El porcentaje de mujeres que mantiene relaciones sexuales sin la utilización de ningún método anticonceptivo se incrementa con la edad. Entre las mujeres menores de 20 años “sólo” el 3,6% tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo alguno, porcentaje que se va incrementando hasta el 24% entre aquellas que cuentan de 25 a 49 años.



## No uso de métodos anticonceptivos

### Utilizan / No utilizan algún método

Base: total mujeres de 15 a 49 años



❖ En mayor medida, las relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos se producen en mayor medida entre las mujeres con estudios primarios (26,1%), las de ingresos familiares altos (20%) y las de menores ingresos (20,7%).

### No utilizan métodos anticonceptivos

ZONA

Base: mujeres de 15 a 49 años que no utilizan métodos anticonceptivos



- no mantiene relaciones sexuales
- tiene relaciones sin método anticonceptivo


	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS			INGRESOS FAMILIARES			
		Primarios	Secundarios	Universitarios	Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
No mantiene relaciones sexuales	11,4%	22,3%	13,6%	4,9%	7,6%	6,4%	8,5%	12,5%
Tiene relaciones sin método anticonceptivo	15,9%	26,1%	14,1%	17,9%	20,0%	16,9%	13,4%	20,7%



## No uso de métodos anticonceptivos

### Utilizan / No utilizan algún método

Base: total mujeres de 15 a 49 años



11,4 % no mantiene relaciones sexuales

15,9% tiene relaciones sin método anticonceptivo

### Motivo por el que no utilizan algún método (respuesta múltiple)



Base: mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos

- ❖ Como puede observarse, el principal motivo de no utilizar métodos anticonceptivos es el hecho de no mantener relaciones sexuales, circunstancia que se argumenta en el 41,6% de los casos.
- ❖ El segundo motivo de no utilizar ningún método anticonceptivo es la imposibilidad para tener hijos (13,2%), seguido de la voluntad de querer tener hijos (11,6%).
- ❖ Analizando el resto de motivos, el 11,4% se refieren a una maternidad reciente o inminente, el 7,2% alude a cuestiones de salud y efectos secundarios y el 6,5% de la mujeres plantea motivos personales (no le gusta, desinterés, desconfianza o comodidad).
- ❖ En menor medida se señalan motivos ideológicos (1,1%) o el peso de la pareja, que no quiere que los utilice (1,0%).



## No uso de métodos anticonceptivos

### Motivo por el que no utilizan algún método

Base: mujeres de 15 a 49 años que no utilizan métodos anticonceptivos

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
No mantiene relaciones sexuales	41,6%	1º 93,0%	1º 69,7%	1º 33,2%	2º 21,7%	2º 16,1%	1º 27,9%	2º 26,8%
Quiere tener hijos	11,6%		2,5%	14,4%	1º 24,0%	1º 29,9%	2º 15,2%	2,3%
Está embarazada	8,9%	1,0%	2º 10,8%	2º 23,9%	3º 19,9%	3º 14,2%	4,4%	
Acaba de dar a luz hace menos de 6 semanas	2,5%				10,8%	5,4%		
No lo necesita porque no puede tener hijos	13,2%			0,8%	4,6%	7,6%	3º 14,1%	1º 43,5%
Efectos secundarios	2,5%	1,0%		0,8%	1,9%	4,5%	6,7%	2,7%
Problemas de salud/indicación médica	4,9%		3º 9,7%	3º 7,0%		6,0%	12,3%	3º 6,1%
Desconfianza	1,0%	1,3%					5,4%	0,3%
No le resultaba cómodo	1,3%	0,9%		4,5%	1,4%	0,6%	0,5%	1,1%
Todos le sientan mal	0,8%				1,4%	1,4%	1,4%	1,2%
Su pareja no quiere o no quería	1,0%	0,7%			1,4%	1,1%		2,0%
Por sus creencias o ideología	1,1%			2,1%	1,6%	3,0%		1,0%
Por su precio	0,2%	0,7%						
Por desinterés	1,8%	1,3%		4,6%		2,9%	3,0%	1,6%
No le gusta/no quiere	2,4%			3,3%	2,2%	0,6%	4,4%	4,9%
Otros	3,5%		7,3%	5,4%	6,1%	6,2%	3,2%	1,4%
NS/NC	2,8%			0,9%	3,0%	3,7%	4,2%	5,7%

- ❖ Entre las mujeres de 20 años, el 93% no utiliza ningún método anticonceptivo porque no mantiene relaciones sexuales.
- ❖ El hecho de no mantener relaciones sexuales es también el principal motivo de no utilizar ningún método anticonceptivo entre las mujeres de 20 a 20 años y las de 40 a 44 años.
- ❖ Entre los 20 y los 29 años la segunda razón más habitual para no utilizar métodos anticonceptivos, mientras que cuestiones de salud representan el tercer motivo.
- ❖ Entre los 30 y los 39 años la razón más frecuente por la que no se utiliza ningún método anticonceptivo es el deseo de tener hijos, y la tercera (tras el hecho de no mantener relaciones) se debe a que ya se encuentra embarazada.
- ❖ A partir de los 40-44 años gana peso el hecho de no poder tener hijos (14,1%), hasta convertirse en el motivo principal entre las mujeres de 45 a 49 años.



## No uso de métodos anticonceptivos

### Ahora no utilizan métodos anticonceptivos pero los han utilizado antes

Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos

	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
Si, alguna vez ha utilizado alguno	64,8%	60,2%
No, nunca los ha utilizado	35,0%	39,8%
Ns/Nc	0,3%	

### ¿Cuánto tiempo hace que ha dejado de utilizar anticonceptivos?

Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos pero los han utilizado antes

	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
Menos de 6 meses	10,8%	7,2%
1 año	24,6%	20,5%
2 años	13,3%	7,6%
3 años	6,6%	16,9%
Más de 3 años	43,6%	46,3%
Ns/Nc	1,0%	1,5%

- ❖ El número de mujeres que no ha utilizado nunca algún método anticonceptivo se eleva en Andalucía (39,8%)
- ❖ El abandono del uso de algún anticonceptivo de larga duración (3 años o más) se registra en mayor medida en Andalucía.



## No uso de métodos anticonceptivos

### Ahora no utilizan métodos anticonceptivos pero los han utilizado antes


Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos



■ Si, alguna vez ha utilizado alguno ■ No, nunca los ha utilizado ■ Ns/Nc

### Método que utilizaban de forma habitual

Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos pero los han utilizado antes




- ❖ Considerando sólo a las mujeres que han dejado de utilizar métodos anticonceptivos, la píldora es el método que en mayor medida se ha dejado de utilizar, seguido del preservativo.
- ❖ El 51,8% de las mujeres que antes utilizaban algún método anticonceptivo, usaba la píldora; mientras que el 32,7% utilizaba el preservativo y el 6,7% el anillo vaginal.



## No uso de métodos anticonceptivos

### Mujeres en riesgo de embarazo no deseado

Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos



■ En riesgo de embarazo no deseado

■ Sin riesgo de embarazo no deseado


- ❖ Las mujeres en riesgo de embarazo no deseado son aquellas que, pudiendo tener hijos, no quieren tenerlos en este momento y mantienen relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo.
- ❖ En estos momentos, globalmente la cifra de estas mujeres se sitúa en el 9% del total de mujeres que no utiliza anticonceptivos, lo que equivale al 2,5% del total de mujeres en edad fértil.



## No uso de métodos anticonceptivos

### Mujeres en riesgo de embarazo no deseado

Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos



- ❖ El porcentaje de mujeres en riesgo de embarazo no deseado se registra fundamentalmente a partir de los 30 años, alcanzando el 26,6% entre las que tienen entre 40 y 44 años de edad.
- ❖ No obstante, entre las menores de 20 años también se detecta un 0,9% de mujeres en riesgo.



## No uso de métodos anticonceptivos

### Mujeres en riesgo de embarazo no deseado

Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES		
		Medios	Medio Bajos	Bajos
En riesgo de embarazo no deseado	9,0%	11,2%	7,9%	13,6%
Sin riesgo de embarazo no deseado	91,0%	88,8%	92,1%	86,4%

- ❖ El porcentaje de mujeres en riesgo de embarazo es mayor entre aquellas con menores ingresos familiares (13,6%).

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
		ANDALUCIA	
En riesgo de embarazo no deseado	9,0%	7,4%	
Sin riesgo de embarazo no deseado	91,0%	92,6%	




## Uso de anticonceptivos reversibles



## Uso de anticonceptivos reversibles


### Uso de métodos anticonceptivos reversibles

Base: total mujeres de 15 a 49 años



### Edad de inicio del método principal que utiliza actualmente (uso por primera vez)

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles



❖ La gran mayoría de las mujeres en edad fértil (60%) utiliza métodos anticonceptivos reversibles, siendo la edad media a la que utilizó por primera vez el método que utiliza actualmente, 21,7 años.

❖ La edad de inicio en la utilización de los distintos métodos que de forma principal utilizan actualmente, varía según cual sea el método del que se trata. La edad media de inicio en el uso del preservativo es de 19 años, el inicio del uso de la píldora se sitúa en torno a los 21 años, el anillo vaginal a los 23 años y el DIU a los 33 años.


COMUNIDAD AUTÓNOMA	
TOTAL	ANDALUCIA
21,73	20,93



## Uso de anticonceptivos reversibles

### Tiempo que lleva usando de forma regular el método reversible actual

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles



- ❖ El uso regular del método anticonceptivo que las mujeres utilizan actualmente se prolonga una media de 7 años.
- ❖ Este uso regular se amplía a 8,47 años en el caso de las mujeres que utilizan el preservativo y desciende a 6,16 entre aquellas que utilizan principalmente la píldora.
- ❖ El uso regular del DIU es de 5,85 años, mientras que el del anillo vaginal se reduce a 3,86 años.
- ❖ Desde la perspectiva de la edad, encontramos que el uso regular del método anticonceptivo utilizado con carácter principal puede llegar a ser superior a los 13 años, como muestra el caso de las mujeres de mayor edad.


TOTAL	EDAD						
	de 15 a 19 años	de 20 a 24	de 25 a 29	de 30 a 34	de 35 a 39	de 40 a 44	de 45 a 49 años
7,07	1,58	3,69	5,05	6,50	8,77	11,58	13,26



## Uso de anticonceptivos reversibles

### Motivo de elección del método anticonceptivo actual

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles



- ❖ Globalmente, la comodidad es el motivo principal a la hora de elegir el método anticonceptivo principal que las mujeres utilizan actualmente (32,8%).
- ❖ La indicación o recomendación médica es la segunda razón más frecuentemente mencionada (16,4%), seguida de la búsqueda de métodos seguros que no perjudiquen la salud (13,3%), de aquellos que provoquen menos efectos secundarios (11,3%) o los que no comporten efectos derivados de las hormonas (6,9%).



## Uso de anticonceptivos reversibles

### Motivo de elección del método anticonceptivo actual

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles

	TOTAL	METODO QUE UTILIZA				
		Preservativo	Píldora	DIU	Anillo vaginal	Otro
<b>Comodidad</b>	<b>32,8%</b>	<b>1º</b> 32,0%	<b>2º</b> 29,9%	<b>1º</b> 37,2%	<b>1º</b> 45,9%	<b>1º</b> 32,6%
Por indicación o recomendación médica	16,4%	5,1%	<b>1º</b> 30,0%	<b>2º</b> 26,1%	<b>2º</b> 27,7%	<b>2º</b> 20,1%
Por seguridad, no perjudica la salud	13,3%	<b>2º</b> 15,5%	10,1%	14,7%	6,5%	13,8%
Es el método con menos efectos secundarios, incompatibilidades...	11,3%	<b>3º</b> 15,2%	2,7%	<b>3º</b> 16,5%	8,8%	11,7%
Otros	7,4%	6,4%	7,3%	9,7%	2,3%	<b>3º</b> 17,1%
Por miedo a los efectos de las hormonas	6,9%	10,0%	1,6%	7,3%	8,5%	3,7%
Mayor Eficacia para prevenir el embarazo	6,9%	4,8%	<b>3º</b> 12,2%	7,6%	1,9%	1,6%
Facilidad de uso	6,5%	7,9%	5,8%	1,0%	1,7%	13,8%
Porque tiene relaciones estables	4,6%	2,4%	8,0%	2,3%	<b>3º</b> 11,8%	3,8%
Protección de las Enfermedades de Transmisión Sexual	3,9%	7,6%		0,8%		
Ayuda a regular la regla	3,0%		9,2%	1,5%	3,2%	2,0%
Porque tiene relaciones esporádicas o poco frecuentes	2,6%	4,6%	0,7%			1,6%
Porque no necesita prescripción ni supervisión médica	2,4%	3,8%	0,8%	0,8%	3,4%	0,8%
Por la facilidad para acceder a el 1	1,8%	3,2%	0,8%			
Porque no tiene pareja estable o cambia frecuentemente de pareja	1,7%	2,4%	0,2%			8,4%
Por el precio	1,4%	2,4%	0,5%			1,7%
Es un método reversible, que puede dejarlo si quiere tener hijos	0,3%	0,3%	0,3%	0,6%		
Porque lo cubre total o parcialmente la Seguridad Social	0,1%		0,4%			
No quiero tener más hijos (métodos irreversibles)	0,1%		0,1%	0,6%		
NS/NC	0,2%	0,3%	0,3%			

- ❖ La comodidad es la principal razón de elección del preservativo, seguido de la seguridad sin impacto en la salud.
- ❖ El uso de la píldora responde prácticamente por igual a la indicación médica y a la comodidad.
- ❖ El uso del DIU, el anillo vaginal y Otros métodos se apoya en mayor medida en la comodidad.



## Uso de anticonceptivos reversibles

### Relaciones sexuales sin método anticonceptivo

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
Nunca	73,6%	66,7%	79,4%	73,8%	70,2%	78,2%	72,7%	72,6%
Casi nunca	21,7%	30,6%	16,5%	22,6%	24,4%	19,8%	20,5%	18,8%
Con bastante frecuencia	4,0%	2,0%	2,8%	3,0%	4,0%	2,0%	6,9%	7,5%
Ns/Nc	0,8%	0,8%	1,3%	0,6%	1,4%			1,2%

❖ El análisis por distintos segmentos muestra que en todos los casos, la mayoría de las mujeres que utiliza algún método anticonceptivo reversible no mantiene nunca relaciones sexuales sin método anticonceptivo.

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA
		ANDALUCIA
Nunca	73,6%	64,7%
Casi nunca	21,7%	29,6%
Con bastante frecuencia	4,0%	5,7%
Ns/Nc	0,8%	

❖ El mantenimiento ocasional de relaciones sin método anticonceptivo (casi nunca) se incrementa entre las mujeres más jóvenes (30,6%), las mujeres de Andalucía (29,6%), aquellas de menor nivel de ingresos (29,6%) y las que utilizan el preservativo (27,5%).

	TOTAL	METODO QUE UTILIZA				
		Preservativo	Píldora	DIU	Anillo vaginal	Otro
Nunca	73,6%	68,3%	81,9%	83,3%	77,0%	56,1%
Casi nunca	21,7%	27,5%	14,6%	11,9%	22,2%	23,0%
Con bastante	4,0%	3,6%	2,4%	3,8%	0,8%	18,9%
Ns/Nc	0,8%	0,5%	1,1%	1,0%		2,0%


	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Nunca	73,6%	73,1%	76,3%	72,2%	62,8%
Casi nunca	21,7%	23,4%	20,0%	22,6%	29,6%
Con bastante frecuencia	4,0%	2,9%	3,3%	4,6%	7,6%
Ns/Nc	0,8%	0,6%	0,4%	0,7%	



## Uso de anticonceptivos reversibles

### Indicación del método utilizado

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles



- ❖ La elección del método anticonceptivo responde en proporciones prácticamente similares a una decisión personal de la propia mujer (45,8%) y a la indicación de su ginecólogo (42,3%).
- ❖ Esta situación se desequilibra a favor de la elección personal de la mujer, cuando estas son menores de 20 años (67,3%) así como entre las que tienen de 20 a 24 años (51,8%)
- ❖ La indicación del ginecólogo gana peso con la edad, convirtiéndose en el prescriptor principal a partir de los 25 años, aunque siempre hay un importante porcentaje de casos en los que la decisión es personal.

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
Usted misma	45,8%	67,3%	51,8%	39,5%	42,9%	40,7%	45,9%	42,9%
Su ginecólogo	42,3%	19,5%	35,7%	45,4%	47,1%	45,2%	46,0%	47,1%
Su Médico de Atención Primaria	9,1%	6,2%	10,7%	11,8%	8,3%	9,1%	7,1%	8,2%
Su enfermera/matrona	1,2%	2,0%	0,6%	1,2%	0,9%	3,7%	0,3%	
En la farmacia	1,0%	3,1%		1,8%	0,8%	1,2%	0,2%	
Ns/Nc	0,7%	1,9%	1,2%	0,2%			0,5%	1,9%



## Uso de anticonceptivos reversibles

### Indicación del método utilizado

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles

- ❖ La elección personal de la mujer se sitúa por delante del papel prescriptor del ginecólogo entre las mujeres con ingresos familiares medios, medio bajo y bajos, mientras que ocurre al contrario entre las mujeres con mayores ingresos.
- ❖ En función de la situación de pareja, la elección personal es ampliamente mayoritaria cuando las mujeres no tiene pareja estable (73,2%), pero la prescripción del ginecólogo gana importancia a medida que se estabiliza la relación de pareja.

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Usted misma	45,8%	42,3%	45,5%	42,5%	41,8%
Su ginecólogo	42,3%	50,8%	44,9%	40,9%	39,7%
Su Médico de Atención Primaria	9,1%	4,8%	7,7%	12,4%	13,8%
Su enfermera/matrona	1,2%	2,1%	0,7%	1,3%	1,2%
En la farmacia	1,0%		0,5%	2,4%	1,0%
Ns/Nc	0,7%		0,7%	0,5%	2,5%

	TOTAL	SITUACIÓN DE PAREJA		
		Conviviendo en pareja	Con pareja estable, pero sin convivencia	Sin pareja estable
Usted misma	45,8%	39,8%	44,2%	73,2%
Su ginecólogo	42,3%	47,3%	43,1%	20,3%
Su Médico de Atención Primaria	9,1%	10,2%	8,7%	5,2%
Su enfermera/matrona	1,2%	1,2%	1,5%	0,3%
En la farmacia	1,0%	1,0%	1,0%	0,8%
Ns/Nc	0,7%	0,4%	1,5%	0,2%

	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
Usted misma	45,8%	51,3%
Su ginecólogo	42,3%	34,7%
Su Médico de Atención Primaria	9,1%	12,3%
Su enfermera/matrona	1,2%	0,5%
En la farmacia	1,0%	1,2%
Ns/Nc	0,7%	




## Uso de método hormonal combinado



## Uso de método hormonal combinado

### Uso de doble método

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos hormonales combinados



- Siempre lo utiliza como único método
- A veces la utiliza en doble método con el preservativo
- Siempre la utiliza en doble método con el preservativo
- Ns/Nc

- ❖ La gran mayoría de las mujeres que utiliza algún método hormonal combinado (píldora, anillo vaginal o parche) siempre lo utiliza como único método (83,4%).
- ❖ El 16,1% lo utiliza en doble método, junto con el preservativo, aunque el 13,2% lo hace de forma ocasional y sólo el 2,9% lo hace siempre.
- ❖ La utilización del doble método es mayor entre las mujeres de 15 a 19 años (44%), y desciende con la edad de manera que tan sólo el 3,4% de las mujeres de 45 a 49 años lo utilizan.
- ❖ De acuerdo al método hormonal utilizado, el uso del doble método es mayor entre las mujeres que utilizan la píldora 17,3%.

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
Siempre lo utiliza como único método	83,4%	56,0%	77,2%	84,5%	87,1%	83,7%	90,9%	96,6%
A veces la utiliza en doble método	13,2%	19,8%	18,4%	14,3%	10,2%	13,4%	9,1%	3,4%
Siempre la utiliza en doble método	2,9%	24,2%	3,0%	1,3%	1,3%	2,8%		
Ns/Nc	0,6%		1,5%		1,4%			

	TOTAL	METODO QUE UTILIZA		
		Píldora	Anillo vaginal	Otro
Siempre lo utiliza como único método	83,4%	82,2%	89,1%	83,9%
A veces la utiliza en doble método con el preservativo	13,2%	13,7%	9,3%	16,1%
Siempre la utiliza en doble método con el preservativo	2,9%	3,6%		
Ns/Nc	0,6%	0,4%	1,6%	



## Uso de método hormonal combinado

### Uso de doble método

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos hormonales combinados

- ❖ La utilización de métodos hormonales combinado (píldora, anillo vaginal o parche) en doble método junto con el preservativo es mayor entre las mujeres sin pareja estable (32,7%) seguidas de aquellas con pareja pero que no conviven con ella (24,7%).
- ❖ En función de los ingresos familiares el uso del doble método es mayor entre las mujeres de ingresos medios (19,3%).

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
<b>Siempre lo utiliza como único método</b>	<b>83,4%</b>	89,8%	80,1%	87,5%	84,1%
<b>A veces la utiliza en doble método con el preservativo</b>	<b>13,2%</b>	5,6%	17,6%	12,0%	13,6%
<b>Siempre la utiliza en doble método con el preservativo</b>	<b>2,9%</b>	4,6%	1,7%	0,5%	2,3%
<b>Ns/Nc</b>	<b>0,6%</b>		0,7%		

	TOTAL	SITUACIÓN DE PAREJA		
		Conviviendo en pareja	Con pareja estable, pero sin convivencia	Sin pareja estable
<b>Siempre lo utiliza como único método</b>	<b>83,4%</b>	90,4%	73,7%	67,2%
<b>A veces la utiliza en doble método con el preservativo</b>	<b>13,2%</b>	9,0%	19,6%	19,6%
<b>Siempre la utiliza en doble método con el preservativo</b>	<b>2,9%</b>	0,6%	5,1%	13,1%
<b>Ns/Nc</b>	<b>0,6%</b>		1,7%	


	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA
		ANDALUCIA
<b>Siempre lo utiliza como único método</b>	<b>83,4%</b>	88,7%
<b>A veces la utiliza en doble método con el preservativo</b>	<b>13,2%</b>	9,7%
<b>Siempre la utiliza en doble método con el preservativo</b>	<b>2,9%</b>	1,6%
<b>Ns/Nc</b>	<b>0,6%</b>	



## Uso de método hormonal combinado


### Descansos periódicos

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos hormonales combinados



### Prescripción de los descansos

Base: mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos hormonales combinados y realizan descansos



	TOTAL	METODO QUE UTILIZA		
		Pildora	Anillo vaginal	Otro
Sí	51,0%	51,2%	41,2%	72,9%
No	48,7%	48,4%	58,8%	27,1%
NS/NC	0,3%	0,4%		

- ❖ Algo más de la mitad de las mujeres que utilizan métodos hormonales realiza descansos periódicos y entre estas, la prescripción del descanso procede mayoritariamente del médico, matrona o enfermera (79,3%).
- ❖ No obstante, el 20,3% de las mujeres que realiza descansos periódicos los lleva a cabo sin que se deba a una indicación médica: el 16,5% lo hace por decisión personal y el 3,8% por consejo de amigas o familiares.
- ❖ De acuerdo al método utilizado, la realización de descanso es menor entre las mujeres que utilizan el anillo vaginal (41,2%), seguidas de las que utilizan la píldora (51,2%).



## Uso de método hormonal combinado

### Descansos periódicos

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos hormonales combinados

	TOTAL	EDAD						INGRESOS FAMILIARES				
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años	Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Sí	51,0%	29,3%	52,1%	53,5%	48,9%	42,4%	56,1%	73,8%	47,4%	53,4%	51,5%	56,8%
No	48,7%	70,7%	47,9%	45,5%	51,1%	57,6%	43,9%	26,2%	52,6%	45,8%	48,5%	43,2%
NS/NC	0,3%			1,0%						0,8%		

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA	SITUACIÓN DE PAREJA
		ANDALUCIA	
Sí	51,0%	49,5%	
No	48,7%	50,5%	
NS/NC	0,3%		

- ❖ La realización de descansos se amplía al 73,8% entre las mujeres de 45 a 49 años, mientras que por el contrario se reduce al 29,3% entre las menores de 20 años.
- ❖ También se observa una mayor incidencia de descansos entre las mujeres de menores ingresos, y una reducción de la misma entre las de mayor nivel de ingresos.



## Uso de método hormonal combinado

### Uso fiel de la píldora

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan la píldora

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
No compra otra y va a buscarla a otra farmacia	61,1%	58,3%	63,0%	63,2%	54,0%
No compra otra, la encarga y espera a que la traigan	27,8%	32,4%	25,5%	26,5%	34,4%
Compra otra que le recomiende el farmacéutico	4,8%	5,9%	4,3%	6,4%	4,8%
Compra otra que conoce	2,0%		1,8%	1,5%	4,9%
Compra cualquier otra	0,8%		1,9%		
Ns/Nc	3,5%	3,5%	3,4%	2,4%	1,9%

	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
No compra otra y va a buscarla a otra farmacia	61,1%	55,8%
No compra otra, la encarga y espera a que la traigan	27,8%	29,3%
Compra otra que le recomiende el farmacéutico	4,8%	7,9%
Compra otra que conoce	2,0%	7,1%
Compra cualquier otra	0,8%	
Ns/Nc	3,5%	

- ❖ La alta fidelidad a la marca de píldora utilizada se mantiene en todas las zonas así como independientemente del nivel de ingresos.




## Uso de preservativo



## Uso de preservativo

### Uso de doble método

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal



- Siempre utiliza el preservativo como único método
- A veces lo utiliza en doble método con otro método hormonal
- Siempre la utiliza en doble método con otro método hormonal
- Ns/Nc

- ❖ La gran mayoría de las mujeres que utiliza el preservativo como método principal siempre lo utiliza como único método (95,2%).
- ❖ El 4,6% lo utiliza en doble método, junto con algún método hormonal, aunque el 3,8% lo hace de forma ocasional y sólo el 0,8% lo hace siempre.
- ❖ La utilización del doble método es mayor entre las mujeres de 20 a 24 años, mientras que se sitúa por debajo del uso a nivel global, a partir de los 40 años de edad.

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
Siempre utiliza el preservativo como único	95,2%	95,4%	92,2%	91,8%	95,3%	96,5%	99,2%	97,3%
A veces lo utiliza en doble método con otro	3,8%	3,9%	6,0%	6,6%	3,5%	2,0%	0,8%	2,7%
Siempre la utiliza en doble método con otro	0,8%	0,7%	1,8%		1,2%	1,5%		
Ns/Nc	0,3%			1,7%				



## Uso de preservativo

### Uso de doble método

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal

- ❖ La utilización de preservativos en doble método junto con métodos hormonales es levemente mayor entre las mujeres sin pareja estable o que no conviven con su pareja.
- ❖ En función de los ingresos familiares el uso del doble método es mayor entre las mujeres de ingresos medios (5,9%).
- ❖ El uso del doble método es mayor en Andalucía (8,6%).

	TOTAL	SITUACIÓN DE PAREJA		
		Conviviendo en pareja	Con pareja estable. pero sin convivencia	Sin pareja estable
Siempre utiliza el preservativo como único método	95,2%	95,9%	94,1%	94,8%
A veces lo utiliza en doble método con otro método hormonal	3,8%	2,9%	5,0%	4,6%
Siempre la utiliza en doble método con otro método hormonal	0,8%	0,7%	0,9%	0,6%
Ns/Nc	0,3%	0,5%		

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Siempre utiliza el preservativo como único método	95,2%	95,9%	95,0%	95,1%	94,1%
A veces lo utiliza en doble método con otro método hormonal	3,8%	4,1%	3,6%	3,2%	5,9%
Siempre la utiliza en doble método con otro método hormonal	0,8%		0,7%	1,7%	
Ns/Nc	0,3%		0,7%		


	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA
		ANDALUCIA
Siempre utiliza el preservativo como único método	95,2%	91,4%
A veces lo utiliza en doble método con otro método hormonal	3,8%	8,6%
Siempre la utiliza en doble método con otro método hormonal	0,8%	
Ns/Nc	0,3%	



## Uso de preservativo

### ¿Suele usted llevar preservativos por si los necesita?

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal



- ❖ Menos de un tercio de las mujeres que utilizan el preservativo como método anticonceptivo principal, suelen llevarlo por si lo necesitan (30,9%).
- ❖ La cantidad de mujeres que llevan preservativo de manera preventiva es mayor entre las que tienen de 15 a 19 años (36,3%) y las de 20 a 24 años (44,3%).
- ❖ Por otra parte, atendiendo al nivel de estudios, la conducta de llevar preservativos se registra con mayor frecuencia a medida que aumenta el nivel educativo.

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
Sí	30,9%	36,3%	44,3%	33,7%	23,2%	29,9%	20,9%	27,5%
No	68,9%	63,7%	55,7%	64,8%	76,8%	70,1%	79,1%	72,5%
NS/NC	0,2%			1,5%				



## Uso de preservativo

### ¿Suele usted llevar preservativos por si los necesita?

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal

- ❖ La cantidad de mujeres que llevan preservativo de manera preventiva se incrementa en el caso de aquellas con ingresos familiares bajos (40,5%), las mujeres que no tienen pareja estable (48,3%) o no conviven con ella (41,6%).

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Sí	30,9%	27,6%	25,1%	29,3%	40,5%
No	68,9%	72,4%	74,9%	70,7%	59,5%
NS/NC	0,2%				

	TOTAL	SITUACIÓN DE PAREJA		
		Conviviendo en pareja	Con pareja estable. pero sin convivencia	Sin pareja estable
Sí	30,9%	18,5%	41,6%	48,3%
No	68,9%	81,5%	58,4%	51,7%
NS/NC	0,2%			


	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
Sí	30,9%	30,6%
No	68,9%	68,2%
NS/NC	0,2%	1,1%



## Uso de preservativo

### Compra de preservativo

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal



■ Siempre o casi siempre ■ De vez en cuando ■ Nunca o casi nunca ■ Ns/Nc

- ❖ Una cuarta parte de las mujeres que utiliza el preservativo como método principal, es quien los compra siempre o casi siempre; mientras que el 40,7% lo hace sólo de vez en cuando.
- ❖ Por el contrario, el 40,7% de las mujeres que lo utiliza, lo compra nunca o casi nunca.
- ❖ La compra, siempre o casi siempre, del preservativo crece con la edad. De esta manera se pasa de un 9,2% de usuarias de 15 a 19 años que lo compra con esa frecuencia, a un 37,6% en el caso de las mujeres de 45 a 49ª años.

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
Siempre o casi siempre	25,5%	9,2%	17,0%	25,3%	26,9%	30,5%	34,1%	37,9%
De vez en cuando	40,7%	33,9%	50,8%	36,4%	48,4%	42,5%	36,1%	32,7%
Nunca o casi nunca	33,6%	56,9%	32,2%	36,8%	24,7%	27,0%	29,8%	29,5%
Ns/Nc	0,2%			1,5%				



## Uso de preservativo

### Compra de preservativo

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal

- ❖ La proporción de mujeres usuarias del preservativo como método principal, que los compra siempre o casi siempre; aumenta a media que desciende el nivel de los ingresos familiares.
- ❖ En relación a la situación de pareja, es entre las que conviven en pareja donde en mayor media la mujer compra siempre o casi siempre los preservativos (32,8%).

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Siempre o casi siempre	25,5%	22,2%	27,2%	29,2%	30,3%
De vez en cuando	40,7%	39,0%	39,8%	38,3%	46,2%
Nunca o casi nunca	33,6%	38,8%	33,0%	32,5%	23,5%
Ns/Nc	0,2%				

	TOTAL	SITUACIÓN DE PAREJA		
		Conviviendo en pareja	Con pareja estable. pero sin convivencia	Sin pareja estable
Siempre o casi siempre	25,5%	32,8%	13,7%	22,3%
De vez en cuando	40,7%	36,8%	43,9%	46,3%
Nunca o casi nunca	33,6%	30,4%	42,3%	31,4%
Ns/Nc	0,2%			


	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA
		ANDALUCIA
Siempre o casi siempre	25,5%	22,6%
De vez en cuando	40,7%	34,6%
Nunca o casi nunca	33,6%	41,7%
Ns/Nc	0,2%	1,1%



## Uso de preservativo

### Uso consistente

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal



- ❖ El 74,9% de las mujeres que utilizan el preservativo como método principal, lo hace de forma consistente, es decir lo utiliza siempre.
- ❖ Por el contrario, el 24,8% no siempre lo utiliza.
- ❖ El uso consistente del preservativo se sitúa por encima del 70% de los casos en todos los intervalos de edad, excepto entre las mayores de 45 años, segmento en el cual desciende al 63,5%.
- ❖ Entre los 20 y 24 años es cuando más consistente resulta el uso del preservativo.

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
Lo utiliza siempre	74,9%	72,4%	85,5%	71,8%	77,5%	75,3%	74,5%	63,5%
A veces no lo utiliza	24,8%	27,6%	14,5%	26,5%	22,5%	24,7%	25,5%	36,5%
Ns/Nc	0,3%			1,7%				



## Uso de preservativo

### Uso consistente

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal

- ❖ El uso consistente del preservativo es mayoritario en todos los segmentos analizados, pero se destaca en las mujeres de ingresos medios, las que tienen pareja pero no conviven con ella.

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Lo utiliza siempre	74,9%	69,9%	78,9%	68,1%	71,3%
A veces no lo utiliza	24,8%	30,1%	20,4%	31,9%	28,7%
Ns/Nc	0,3%		0,7%		

	TOTAL	SITUACIÓN DE PAREJA		
		Conviviendo en pareja	Con pareja estable. pero sin convivencia	Sin pareja estable
Lo utiliza siempre	74,9%	73,4%	78,7%	74,6%
A veces no lo utiliza	24,8%	26,1%	21,3%	25,4%
Ns/Nc	0,3%	0,5%		


	COMUNIDAD AUTÓNOMA	
	TOTAL	ANDALUCIA
Lo utiliza siempre	74,9%	69,2%
A veces no lo utiliza	24,8%	30,8%
Ns/Nc	0,3%	



## Uso de preservativo

### Uso consistente


Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal



■ Lo utiliza siempre ■ A veces no lo utiliza ■ Ns/Nc

### Motivos de uso inconsistente

Base: mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal y de manera inconsistente




- ❖ En el 33,3% de los casos el uso inconsistente del preservativo se debe a lo imprevisto de las relaciones que implica no disponer de preservativo en ese momento.
- ❖ Por otra parte, un 24,9% de las mujeres que no siempre lo utilizan hacen referencia al hecho de que no lo hacen en los días fértiles.
- ❖ Un 17% de las mujeres que declaran un uso inconsistente del preservativo, lo hacen para no interrumpir la relación para que su pareja se lo ponga, mientras que un 8,8% lo justifican por el estado de euforia motivada por el consumo de alcohol o drogas.



## Uso de preservativo

### Uso correcto o incorrecto

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal



- Si, lo utiliza desde el principio
- No, lo utiliza después de que la relación ya se ha iniciado
- Ns/Nc

- ❖ El 58% de las mujeres que utilizan el preservativo como método principal, lo hace de forma correcta, es decir desde el principio.
- ❖ Por el contrario, el 39,4% lo utiliza después de que la relación se haya iniciado.
- ❖ El uso correcto del preservativo es más frecuente entre las mujeres de 15 a 29 años, edad a partir de la cual inicia una trayectoria descendente.

	TOTAL	EDAD						
		de 15 a 19 años	de 20 a 24 años	de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
Si, lo utiliza desde el principio	58,0%	63,8%	71,6%	71,1%	58,5%	54,0%	40,2%	40,4%
No, lo utiliza después de que la relación ya se ha iniciado	39,4%	31,7%	28,4%	22,8%	39,6%	45,4%	57,4%	56,3%
Ns/Nc	2,7%	4,5%		6,1%	1,8%	0,5%	2,4%	3,2%



## Uso de preservativo

### Uso correcto o incorrecto

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal

- ❖ El uso correcto del preservativo (desde el principio de la relación) se hace más más habitual a menor nivel de ingresos, llegando al 65,1% entre las mujeres de ingresos más bajos.
- ❖ En relación a la situación de pareja, el uso correcto se relaja cuando hay convivencia.
- ❖ Por zona geográfica, el uso correcto es mayor en Andalucía.

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Si, lo utiliza desde el principio	58,0%	46,7%	51,9%	64,0%	65,1%
No, lo utiliza después de que la relación ya se ha iniciado	39,4%	51,0%	45,2%	36,0%	33,0%
Ns/Nc	2,7%	2,4%	2,9%		1,9%

	TOTAL	SITUACIÓN DE PAREJA		
		Conviviendo en pareja	Con pareja estable. pero sin convivencia	Sin pareja estable
Si, lo utiliza desde el	58,0%	48,9%	68,0%	68,4%
No, lo utiliza después de que la relación ya se ha	39,4%	48,1%	28,8%	30,4%
Ns/Nc	2,7%	3,0%	3,3%	1,3%

	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA
		ANDALUCIA
Si, lo utiliza desde el	58,0%	65,5%
No, lo utiliza después de que la relación ya se ha	39,4%	33,4%
Ns/Nc	2,7%	1,1%




## Uso de DIU



## Uso de DIU

### Controles periódicos

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el DIU como método anticonceptivo principal



- ❖ La práctica totalidad de las mujeres que utilizan el DIU como métodos anticonceptivo principal, llevan a cabo controles periódicos.

#### COMUNIDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	ANDALUCIA
Sí	95,7%	100,0%
No	4,3%	



## Uso de DIU


### Controles periódicos

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el DIU como método anticonceptivo principal


■ Sí

■ No

USUARIAS DEL DIU DE COBRE



USUARIAS DEL DIU HORMONAL



❖ La realización de controles periódicos es igualmente generalizada entre las usuarias del DIU de cobre como del DIU hormonal.




## Uso de métodos irreversibles



## Uso de métodos irreversibles


### Conocimiento de métodos de larga duración

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos irreversibles



### En caso de que hubiera conocido o le hubieran ofrecido estos métodos reversibles ¿Hubría optado por ellos o por la ligadura de trompas o vasectomía como finalmente optó?

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos irreversibles y no conocían los métodos reversibles de larga duración



- ❖ La práctica totalidad de mujeres que han recurrido a la esterilización voluntaria (propia o de su pareja) conocían la existencia de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración como el DIU o el implante subcutáneo.
- ❖ Considerando únicamente a aquellas mujeres que no conocían dichos métodos reversibles cuando decidieron recurrir a un método irreversible (5,9%), la mayoría de ellas (62,8%) hubiera seguido optando por la ligadura de trompas o la vasectomía de su pareja.



## Uso de métodos irreversibles

### Conocimiento de métodos de larga duración

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos irreversibles

❖ El conocimiento de la existencia de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración como el DIU o el implante subcutáneo, es ampliamente mayoritario en todos los segmentos de mujeres usuarias de los métodos irreversibles.

❖ En todos caso cabe mencionar un ligero descenso entre aquellas de menor nivel de ingresos (82,1%), así como entre las de menor nivel de estudios (89,6%).

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Sí	93,7%	97,3%	94,0%	95,0%	82,1%
No	5,9%	2,7%	5,0%	5,0%	17,9%
NS/NC	0,4%		1,0%		

	TOTAL	NIVEL DE ESTUDIOS		
		Primarios	Secundarios	Universitarios
Sí	93,7%	89,6%	94,2%	93,6%
No	5,9%	10,4%	5,8%	4,9%
NS/NC	0,4%			1,4%


	TOTAL	COMUNIDAD AUTÓNOMA
		ANDALUCIA
Sí	96,3%	100,0%
No	3,7%	



## Uso de métodos irreversibles

### Arrepentimiento del uso de métodos irreversibles

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos irreversibles



	TOTAL	EDAD				
		de 25 a 29 años	de 30 a 34 años	de 35 a 39 años	de 40 a 44 años	de 45 a 49 años
Sí	4,0%		17,5%	4,9%	1,5%	3,9%
No	95,7%	100,0%	82,5%	95,1%	97,5%	96,1%
NS/NC	0,4%				1,0%	

- ❖ La práctica totalidad de las mujeres que utilizan un método anticonceptivo irreversible, no se arrepiente de su decisión (95,7%).
- ❖ Este elevado nivel de satisfacción con la decisión tomada se mantiene en todos los tramos de edad, si bien entre las mujeres de 30 a 44 años se registra un 17,5% de arrepentidas.
- ❖ El porcentaje de mujeres arrepentidas de haber optado por un método irreversible también se eleva ligeramente entre las mujeres de menos ingresos y las residentes de Andalucía.

	TOTAL	INGRESOS FAMILIARES			
		Altos	Medios	Medio Bajos	Bajos
Sí	4,0%	6,0%	2,5%	1,9%	8,3%
No	95,7%	94,0%	96,5%	98,1%	91,7%
NS/NC	0,4%		1,0%		

	TOTAL	ANDALUCIA
	Sí	4,0%
No	95,7%	88,9%
NS/NC	0,4%	1,6%



## Metodología

Encuesta realizada por SIGMADOS

### ENCUESTA DE POBLACIÓN

**Universo:** Mujeres de 14 a 50 años

**Ámbito:** Nacional

**Muestra:** 2.200 entrevistas validas

**Margen de error:** Margen de error para datos globales:  $\pm 2,2\%$ .

**Distribución:** Aproporcional, asignando un número fijo de 300 entrevistas en 6 Comunidades Autónomas (Andalucía, Cataluña, C. Valenciana, C. de Madrid y Galicia) y 400 para el resto de España. Para el análisis de los datos globales se ha devuelto la proporcionalidad a las entrevistas de cada CCAA de acuerdo a su peso real en el conjunto de la población española

**Selección:** La selección última de la persona entrevistada será aleatoria

**Tipo de entrevista:** Telefónica, mediante sistema CATI

**Cuestionario:** Estructurado, con 40 preguntas más las variables socio demográficas

**Fecha del trabajo de campo:** 18 de febrero a 5 de marzo de 2014